

	Mécanismes d'action	Formes disponibles + actions	Effets indésirables
B2 mimétique (CA : Salbutamol, terbutaline) (LA : Salmétérol, formotérol)	Agoniste sélectif des Rr B2 - Dilatation muscle bronchique - Inhibition sécrétion médiateurs mastocytaires - Hydratation et facilite évacuation mucus bronchique	<u>Courte durée :</u> - Action en < 30min - Durée : 4-6h - TTT de la crise - Seul ou combiné - Voie respiratoire ou injectable	- Tremblements des extrémités - Tachycardie, palpitations - HypoK → En début de TTT → Tolérance possible → Pas de CI absolue
		<u>Longue durée :</u> - 12h - Salmétérol, formotérol - Respiratoire ou orale - TTT asthme non contrôlé par corticoT inhalée - PAS seul	
Xanthine (à proscrire !!!)	- Antiasthmatique - Stimulation SNC - Stimulation CV - Faiblement diurétique	Inactive par voie inhalée → PO ++ - TTT symptomatique continu de l'asthme persistant et autres BPCO	+++ , Dose dépendant - Tachycardie, TdR - Tremblements, céphalées, nervosité, insomnie - Nausées, vomissements, diarrhée - Crise comitiale chez l'enfant
Bronchodilatateur anticholinergique	- Antagoniste muscarinique	- Action rapide : 30min - Durée d'action : 5h - TTT de la crise, des exacerbations asthmatiques - En association avec un B2 mimétique	
Corticostéroïde +++ +	- Activité anti-inflammatoire - Diminution hyperréactivité bronchique	- Effet anti-inflammatoire en 5-10 jours - Forme inhalée ++ - Forme systémique pour exacerbations - TTT de fond de référence de l'asthme	CI relatives des AINS <u>Locaux :</u> Candidose oropharyngée, gêne pharyngée, raucité voix, dysphonie, réaction d'hyperS cutanée <u>Généraux :</u> Amincissement cutané, hématomes sous-cutanés, insuffisance surrénalienne biologique, raréfaction tissu osseux
Antileucotriène	- Antagoniste Rr aux leucotriènes - Anti-inflammatoire et BronchoD	- PO - Alternatif aux B2 mimétiques CA	PAS de CI